

wykładaną w sposób ciągły (np. w celu zapobiegania infestacji gryzoni lub wykrucia ich aktywności). Stosować wyłącznie w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych; stacje należy oznakować zgodnie z zaleceniami dla produktu. Zastosowanie tego produktu powinno zwaćczyć gryzonia w ciągu 35 dni. W przypadku podejrzenia braku skuteczności produktu pod koniec okresu zwalczania gryzoni (np. odnotowania dalszej aktywności gryzoni) użytkownik skontaktował się z dostawcą/sprzedawcą lub skontaktował się ze specjalistyczną firmą zajmującą się deratyzacją. W trakcie zabiegu nie należy myć wodą stacji deratyzacyjnych. Padłe gryzonia usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. Do użytku wokół budynków: Nie stosować produktu bezpośrednio do nor gryzoni.

INSTRUKCJE W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY ORAZ ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA W NAGŁYCH WYPADKACH: Skutki uboczne/działania niepożądane: Produkt zawiera substancje należące do grupy antykoagulantów. W przypadku spożycia objawy mogą wystąpić z opóźnieniem i obejmują krwawienie z nosa i z dziąseł. W ciężkich przypadkach może dochodzić do powstawania siniaków oraz obecności krwi w kale i mocz. Antidotum: Witamina K1 podawana wyłącznie przez personel medyczny/weterynaryjny.

Pierwsza pomoc: W przypadku: kontaktu ze skórą: spłukać skórę wodą, a następnie umyć wodą z mydłem. Kontakt z oczami: przemyć oczy roztworem do przepłukiwania oczu lub wodą, utrzymując powieki otwarte przez co najmniej 10 minut. Kontakt z jamą ustną: ostrożnie przepłukać jamę ustną wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku pokłucia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać opakowanie produktu lub etykietę.

W przypadku spożycia produktu przez zwierzę domowe należy skontaktować się z lekarzem weterynaryjnym. Oznakowania na stacjach deratyzacyjnych muszą zawierać następujące informacje: „nie przenosić ani nie otwierać”; „zawiera substancje gryzoniobójcze”; „BRODITOP GEL” lub „PL/2017/0259/MR”; „Substancja czynna: brodifakum”; „W razie wypadku skontaktować się z ośrodkiem kontroli żuraw (Warszawa: 607 218 174; Gdańsk: 058 - 682 04 04; Poznań: 061-847 69 46; Kraków: 012 - 411 99 99)”.
Ośrodek Kontroli Żuraw - Warszawa / Telefony alarmowe: 607 218 174 / Region kontroli żuraw produktami biobójczymi: Województwa: mazowieckie, łódzkie, podlaskie oraz lubelskie. **Mazowieckie Centrum Toksykologii /** Telefon alarmowy: 058 - 682 04 04 / Region kontroli żuraw produktami biobójczymi: Województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie. **Ośrodek Informacji Toksykologicznej Oddział Toksykologii im. dr Wandy Bieńskiej Szpital Miejski im. Franciszka Rasze /** Telefony alarmowe: 061 - 847 69 46 / Region kontroli żuraw produktami biobójczymi: Województwa: wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie. **Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratorijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum /** Telefony alarmowe: 012 - 411 99 99 / Region kontroli żuraw produktami biobójczymi: Województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie.

Środki ochrony środowiska: W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska, należy go zebrać (mechanicznie) unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni).

- Produkt niebezpieczny dla dzikich zwierząt.
Do użytku wewnątrz budynków: Podczas umieszczania stacji deratyzacyjnych w pobliżu systemów odprowadzania wody należy dopilnować, aby przynęta nie miała kontaktu się z wodą.
Do użytku wokół budynków: W przypadku umieszczenia stacji deratyzacyjnych w pobliżu wód powierzchniowych (np. rzek, stawów, cieków wodnych, wałów, rowów nawadniających) lub systemów drenażujących należy dopilnować, aby przynęta nie miała kontaktu z wodą.

Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania: Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem (w tym woda wykorzystana do mycia zanieczyszczonych produktem powierzchni), pozostałości produktu po zastosowaniu (w

BRODITOP® GEL - GOTOWY DO UŻYCIA RODENTYCYD W FORMIE PRZYŃĘTY W POSTACI ŻELU (grupa produktowa 14)

Zawiera : Brodifakum (CAS N° 56073-10-0) 0,005% w/w

H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. H373 Może powodować uszkodzenie narządów długotrwale lub narażenie powtarzane.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. P280 Stosować rękawice ochronne. P308+P313 W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Posiadacz pozwolenia/Dostawca: ZAPI S.p.A.
Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) Włochy -
Tel. +39 049 9597737. www.zapispa.com, info@zapispa.com.

Numer pozwolenia: PL/2017/0259/MR

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZAWODOWEGO

tym przynętę zależoną poza stacją deratyzacyjną) zamknięte w oznakowanym pojemniku, usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania: Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych i hodowlanych. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 35°C. Przechowywać z dala od światła słonecznego. Chronić przed mrozem.

Długość okresu przechowywania: do 2 lat od daty produkcji

Linie informacyjne: Ze względu na mechanizm działania substancji należących do grupy antykoagulantów skutki zastosowania produktów gryzoniobójczych je zawierających można zaobserwować po upływie 4-10 dni po spożyciu przynęty / Gryzonia mogą przenosić choroby. Padłe gryzonia i przynęty należy usuwać, stosując rękawice ochronne lub narzędzia, np. szczypce/ Produkt zawiera czynnik znieczulający do przypadkowego spożycia oraz barwnik.

Zawiera : Syntetyczny amorficzny ditlenek krzemu (nano) (CAS N° 7631-86-9) 4,5% w/w

Numer partii i data produkcji: zobacz opakowanie

NIE SPRZEDAWAĆ OSOBNO

Zawartość: 300g

069489DEZD.04RR



JEDYNIEM DLA UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH

BRODITOP® GEL jest gotową do użycia przynętą w postaci żelu do zwalczania myszy domowych (*Mus musculus*) i szczurów wędrownych (*Rattus norvegicus*) na wszystkich etapach rozwoju; zawiera środek gorzki (*Benzoesan denatonium*), aby zapobiegać spożyciu przez ludzi.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:

Kategoria użytkowników: Profesjonalny
Metoda aplikacji: Przynęta gotowa do użycia do stosowania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych.

Włożyć tubkę z żelem do wewnątrz pistoletu wyciskającego; Wyciąć otwór w stożkowej końcówce tubki i wsunąć dyszę. Wytnij dyszę powyżej gwintu, dbając o to, aby nie uszkodzić gwintu i dozować produkt.

Po zakończeniu czynności założyć nakrętkę zabezpieczającą i zwinąć docisk pistoletu wyciskającego, aby zapobiec wyciekowi preparatu. Tubkę przechowywać odwróconą do góry dnem z dala od źródeł ciepła.

Dawk i częstotliwość stosowania:

• Do kontroli myszy domowych (*Mus musculus*) - do użytku wewnątrz i wokół budynków:

- Niska infestacja (mala liczebność organizmów szkodliwych);

50 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m.

- Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych);

50 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 2 m.

Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (na początku okresu zwalczania przynajmniej co 2-3 dni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonia.

Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).

• Do kontroli szczurów wędrownych (*Rattus norvegicus*) - do użytku wewnątrz i wokół budynków:

- Niska infestacja (mala liczebność organizmów szkodliwych);

100 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 10 m.

- Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych);

100 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m.

Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (na początku okresu zwalczania przynajmniej co 5-7 dni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonia.

Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).

Do użytku wokół budynków: Stacje deratyzacyjne powinny zabezpieczyć przynętę przed działaniem warunków atmosferycznych (deszczem, śniegiem, itp.). Stacje deratyzacyjne rozmieszczać w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem. Wymieniać każdą przynętę uszkodzoną przez wodę lub zanieczyszczoną.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA: Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń zamieszczonych w materiałach informacyjnych dołączonych do produktu lub informacji przekazanych w punkcie sprzedaży. Przed zastosowaniem przynęty należy przeprowadzić wstępne rozpoznanie terenu, na którym

występują gryzonia, w celu właściwej identyfikacji gatunku gryzonia, miejsc aktywności oraz ustalenia prawdopodobnej przyczyny i stopnia infestacji gryzoni. Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla gryzoni (np. rozsypane ziarno lub pozostałości żywności). Przed zastosowaniem produktu nie należy ingerować w środowisko bytowania gryzoni, gdyż może mieć to wpływ na zachowanie zwierząt i spożycie przynęty. Produkt powinien być stosowany zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM), dobrą praktyką higieniczną oraz, gdzie to możliwe, przy zastosowaniu niechemicznych metod kontroli. W celu zwiększenia spożycia przynęty oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa ponownej infestacji należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze (np. zatykanie otworów, usuwanie potencjalnych źródeł pokarmu dla gryzoni). Stacje deratyzacyjne powinny być umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, w których zaobserwowano aktywność gryzoni (np. ścieżki, miejsca gnadowania, miejsca kamienia zwierząt hodowlanych, gnojowicy, nory itp.). Tam gdzie jest to możliwe, stacje deratyzacyjne należy przytwierdzić do podłoża lub innych struktur. Stacje deratyzacyjne należy wyraźnie oznakować tak, aby było oczywiste, że zawierają produkty gryzoniobójcze, i że nie wolno przy nich manipulować. Miejsca publiczne, w których stosowany jest produkt powinny być odpowiednio oznakowane. W pobliżu punktów wyłożenia przynęty powinna znajdować się informacja, że kontakt z produktem lub padłymi gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacja o zasadach udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia produktem. Tam gdzie jest to możliwe zabezpieczyć przynętę w taki sposób, aby nie mogła być ona wyzionoza. Stacje deratyzacyjne należy umieszczać z dala od zwierząt domowych i ptaków, zwierząt hodowlanych i zwierząt innych niż docelowe. Stacje deratyzacyjne należy umieszczać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt oraz z dala od przyborów kuchennych i powierzchni mijanych z nimi kontakt. Nosić odpowiednie rękawice ochronne (wykonane zgodnie z normą EN 374, kategoria III). Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Po zastosowaniu produktu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni kontakt z produktem. Jeżeli spożycie przynęty jest zbyt niskie w porównaniu do oszacowanego stopnia infestacji gryzoni, należy rozważyć przeniesienie stacji deratyzacyjnych w inne miejsca lub zmianę postaci użytkowej produktu. Jeżeli po upływie 35 dni od rozpoczęcia zwalczania gryzoni przynęta jest w dalszym ciągu zjadana, a aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy ustalić przyczynę braku skuteczności zabiegu. Jeżeli stwierdzono lub podejrzewa się zjawisko oporności na brodifakum należy zastosować produkt zawierający inną substancję z grupy rodentyków. Należy również rozważyć zastosowanie niechemicznych metod kontroli (np. pułapek). Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć stacje deratyzacyjne oraz przynętę zależoną poza stacjami. Używać szpatułki do usuwania przynęty po aplikacji (czyszczenie/usuwanie). Oczyścić szpatułkę zmiatając i usuwając zgodnie z lokalnymi przepisami.

ŚRODKI ZMIESZAJĄCE RYZYKO: O ile jest to możliwe, przed rozpoczęciem zwalczania gryzoni należy poinformować ewentualne osoby postronne (np. użytkowników obszaru zwalczania gryzoni i najbliższego otoczenia) o rozpoczęciu deratyzacji (zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM)). Aby zmniejszyć ryzyko zatrucia wtórnego, należy często i regularnie wyszukiwać i usuwać padłe gryzonia przez cały okres deratyzacji (np. przynajmniej dwa razy w tygodniu lub częściej, jeśli zaistnieje taka potrzeba). Nie stosować produktu dłużej niż 35 dni bez wcześniejszej oceny stopnia infestacji i skuteczności zwalczania gryzoni. Nie należy stosować produktu w zabiegach z przynętą

Dystrybutor:
DEZ-DER Krzysztof Karpiński
Łopacińska 62 08-412 Borowie - Tel. 801-DEZ-DER
www.dezder.com.pl



Cliente / Customer	Paese / Country	Data / Date	Print Colours
Name	Country	21.02.2021	<input type="checkbox"/>
Cod imballo / Pack code	Rev.		<input type="checkbox"/>
069	.00		<input type="checkbox"/>
Soggetto / Subject			
Cartridge 300g -			
Dimensione / Dimensions		Cod. Fustella / Punch cutter code	
153x188mm (b.153)		Cartridge Label	

© Zapi S.p.A.